

Impfungen

Oftmals berichten die Flüchtlinge über Impfungen als Kind oder durch die WHO, Dokumente sind aber meist nicht mehr vorliegend. In diesen Fällen wird empfohlen die PatientInnen zu impfen wie ungeimpfte Erwachsene gemäss den Empfehlungen des BAG.



www.bag.admin.ch

Nachholimpfschemata für ungeimpfte Kinder und Erwachsene (Stand 2024)

Impfstoff Aktuelles Alter	Anzahl Dosen ¹	Primovakzination (Intervalle, Monate)	Erste Auffrischimpfung (Zeitpunkt nach erster Dosis, Monate)	Nächste Auffrischimpfungen (Alter)
DTP_a				
3–5 Monate	5	0, 2	8	4–7 Jahre ^{3,4} , 11–15 Jahre
6–11 Monate	5	0, 1 ²	8	4–7 Jahre ^{3,4} , 11–15 Jahre
12 Monate – 3 Jahre	5	0, 2	8	4–7 Jahre ^{3,4} , 11–15 Jahre
4–7 Jahre	4	0, 2	8	11–15 Jahre ^{3,5}
dTp_a / dT⁶				
8–10 Jahre	4	0 (dTp _a), 2 (dT _a)	8 (dT)	11–15 Jahre (dTp _a) ³
11–24 Jahre	3	0 (dTp _a), 2 (dT)	8 (dT)	25 Jahre (dTp _a) ⁵
25 Jahre	3	0 (dTp _a), 2 (dT)	8 (dT)	45 Jahre (dT) ⁵
26–64 Jahre ⁵	3	0 (dT), 2 (dT)	8 (dT)	65 Jahre (dT) ⁵
≥ 65 Jahre	3	0 (dT), 2 (dT)	8 (dT)	alle 10 Jahre (dT) ⁵
IPV⁷				
3–5 Monate	4	0, 2	8	4–7 Jahre ^{3,7}
6–11 Monate	4	0, 1 ²	8	4–7 Jahre ^{3,7}
12 Monate – 3 Jahre	4	0, 2	8	4–7 Jahre ^{3,7}
4–7 Jahre	4	0, 2	8	11–15 Jahre ^{3,7}
8–10 Jahre	4	0, 2	8	11–15 Jahre ^{3,7}
≥ 11 Jahre und Erwachsene	3	0, 2	8	
Hib				
3–5 Monate	3	0, 2	8	
6–11 Monate	3	0, 1	8	
12–23 Monate	2	0, 2		
24–59 Monate (< 5 Jahre)	1	0		
≥ 5 Jahre	0 ⁸			
HBV⁹				
3–5 Monate	3 ¹⁰	0, 2 ¹⁰	8 ¹⁰	
6–11 Monate	3 ¹⁰	0, 1 ¹⁰	8 ¹⁰	
12–15 Jahre	2 ¹¹	0	4–6	
≥ 16 Jahre und Erwachsene	3 ¹²	0, 1	6	
Pneumokokken (PCV)				
3–5 Monate	3	0, 2	8	
6–11 Monate	3	0, 1	8	
12–23 Monate	2	0, 2		
24–59 Monate (< 5 Jahre)	1	0		
5–64 Jahre	0 ¹³			
≥ 65 Jahre	1 ¹³			
MMR¹⁴				
12 Monate – 18 Jahre	2	0, ≥ 1		
Erwachsene jünger als Jg. 1963 ¹⁵	2	0, ≥ 1		
Erwachsene Jg. 1963 und älter	0			
Varizellen^{14,16}				
12 Monate – < 40 Jahre	2	0, ≥ 1		
HPV¹⁷				
15–19 Jahre (Jugendliche)	3	0, 2	6	
Meningokokken B				
4–11 Monate	3	0, 2	8	
12–23 Monate	3	0, 2	14 ¹⁸	
24–59 Monate (< 5 Jahre)	2	0, 1		
16–19 Jahre	2	0, 1		
Meningokokken ACWY				
19–59 Monate (< 5 Jahre)	1 od. 2 ¹⁹	0, 2		
16–19 Jahre	1			